

VACUNACIÓN ESCOLAR

Juntos protegemos la salud de nuestros
escolares y adolescentes



Calendario de vacunación escolar

○ En la etapa escolar, el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) del Ministerio de Salud, refuerza la protección a través de la **vacunación** en escolares y adolescentes contra las siguientes **enfermedades:**


Las vacunas son **gratuitas para todos los escolares** según edad o curso, tanto para los que se encuentran en el sistema formal como para los no escolarizados.

	dTpa (acelular)	VPH
1° Básico	X	
4° Básico		X
5° Básico		X
8° Básico	X	


¿Dónde se realiza la vacunación escolar?

○ La vacunación se realiza **en todos los establecimientos educacionales** del país, públicos y privados, **durante el segundo semestre** del año escolar.

○ Los equipos de atención primaria de salud coordinan fecha y horario con el establecimiento educacional para desarrollar la **vacunación**.



Si su hijo **no** asiste a un establecimiento educacional o por alguna razón no recibió la vacuna, **puede vacunarse** concurriendo a alguno de los **vacunatorios públicos** y privados en convenio del país.



¿Contra qué te protege la vacuna?

Vacuna dTpa (acelular)

Protege contra Difteria,
Tétanos y Tos Convulsiva

○ Durante el primer y segundo año de vida, los lactantes están protegidos contra estas enfermedades, sin embargo, es **necesario** mantener esta protección en la etapa escolar a través de la administración de dosis de refuerzo.


Vacuna VPH

Protege contra enfermedades causadas
por el Virus Papiloma Humano

○ La vacuna protege contra los serotipos 6, 11, 16 y 18, que causan desde **verrugas genitales** hasta **cáncer de cuello de útero, vulva, vagina, pene y ano**.

○ La administración de la vacuna en edades tempranas **augmenta** la protección contra estos serotipos debido a que el sistema inmune responde mejor a la vacuna en estas edades.

○ Se deben administrar 2 dosis de la vacuna con intervalo de 12 meses.



SEGURIDAD DE LAS VACUNAS

Las vacunas pueden causar reacciones leves posterior a su administración. Las reacciones más frecuentes son: dolor, leve hinchazón y enrojecimiento en el sitio de inyección. Entre las menos frecuente se encuentra la fiebre y malestar general.

Las vacunas son muy eficaces y seguras, cuentan con altos estándares de calidad en su fabricación, lo que está avalado por estudios científicos.



SEREMI
Región de Tarapacá

Ministerio de
Salud

Para mayor información, visite:
vacunas.minsal.cl

LLAME A SALUD RESPONDE

600 • 360 • 7777

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS
DUDAS LAS 24 HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA